

## Giftige planten voor grazers

*NB: Lang niet alle giftige planten zijn voor alle grazers even giftig. Over het algemeen kan een schaap ook giftige planten in kleine hoeveelheden nog goed hebben. Maar het blijft opletten.*

- Adelaarsvaren:
- Bastaardklaver:

*De hele plant is giftig. Het eten hiervan kan zonnebrand, hoefbevangenheid en leverstoornissen veroorzaken. Het paard is nerveus en geagiteerd. De huiduitslag ( huid ziet rood, wondjes die slecht genezen) kan men met een zalf behandelen en het paard op een minder eiwitrijke voeding plaatsen. Het krachtvoer verminderen en met de helft aanvullen van spelt. Bovenaan de bastaard- en daaronder de gewone witte en de rode klaver, die niet giftig zijn.*



- Bereklauw
- Boerenwormkruid
- Buxus
- Eikels (Onrijpe): *alleen na opname van grote hoeveelheden.*
- Ganzenvoet: *Melde, witte ganzenvoet, melganzenvoet, akkeronkruid*
- Gevlekte scheerling
- Hedera (Klimop): *vergiftigingsverschijnselen lijken op die van de eikels.*



- Hondsdraf:  
*Gedijt op schrale en verzuurde grond. Dicamix-G vloeibaar van Luxan van DCM (De Ceuster Meststoffen) is goed om hondsdraf te bestrijden, maar is chemisch en de dieren mogen dan vier tot 6 weken niet op het perceel.*
- Kattestaart ofwel heermoes:

Een overblijvend onkruid dat vooral op vochtige en enigszins verdichte plaatsen voorkomt. Met name de wortelstokken en knolletjes die losraken van de planten zijn belangrijk voor de verspreiding en het overblijven. De plant is te bestrijden met een mengsel van 20% (schoonmaak)azijn met water in de felle zon. Een andere oplossing is de grond te bemesten met kalk, omdat dit de verzuring tegengaat. Ook zegt iemand resultaat te behalen door afgeknipt heermoes in water tot een soep te koken en dit op de grond aan te brengen: de heermoes zou zichzelf dan dood groeien. Elke behandeling zal echter vaker moeten worden herhaald.

- Klapproos
- Laurierkers
- Monnikskap
- Nachtschade achtige: zoals Bitterzoet en Nachtschade
- St. Jacobskruiskruis: *zeer giftig voor alle grazers.*



- Sint-janskruid  
De hele plant is giftig. Ook gedroogd in het hooi blijft het giftig. Vooral paarden met een witte huid vertonen het eerst de symptomen. De huid gaat ontsteken en laat los. Deze plekken zijn zeer pijnlijk. Gebrek aan eetlust, zwakte, onzeker lopen en coma kunnen andere verschijnselen zijn.



- Rodondendron: *sterfte door ademhalingstilstand.*
- Smeerwortel: *kent een witte en paarse variant.*



- Taxus  
*De taxus wordt meestal in haagvorm gezet. Bijna alle haagplanten en coniferen zijn giftig. Taxus is zeer giftig en na 5 minuten kan de dood intreden.*

- Coniferen

- Waterscheerling  
*Waterscheerling is een hoge plant met holle stelen en witte bloemschermen. Alle plantdelen zijn giftig en zelfs in kleine hoeveelheden ingenomen is het al dodelijk. Het veroorzaakt krampen, de dieren worden onrustig, ze schuimbekken, ze knarsetanden en hebben verwijde neusgaten en pupillen. Uiteindelijk vallen ze bewusteloos en sterven. Een behandeling is niet mogelijk.*



- Vingerhoedskruis

- Vogelkers: *komt w's als aanplanting op ons terrein voor.*



- Wolfsmelk: *dit kruid omvat en groot geslacht met vele ondersoorten, zoals de tuinwolfsmelk.*



Voor mensen giftige planten zijn o.a.:

ligustrum, brem, rhododendron, azalea, hulst, lupinen, klimop, vuurdoorn, cotoneaster, laurierkers, lijsterbes, pruikeboom, zomereik, paardekastanje, de bladeren en schors van de vlier